

IMPACTO SPRAY

Uso Veterinario

Producto líquido
Larvicida y Antiséptico.
Registro ICA N°: 5486-DB.

Composición:

Cada 100,00 mL contiene:

Clorpirifos 5,00 g 5,00% p/v
Violeta de Genciana..... 0,30 g 0,30% p/v
Excipientes c.s.p. 100,00 mL 100,00% p/v

Indicaciones:

Impacto® Spray es indicado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos como antiséptico, larvicida para el control de la miasis cutáneas en heridas por castración, tratamiento de ombligo de los recién nacidos y heridas en general.

Impacto Spray es un coadyuvante en la cicatrización y repelente de insectos.

Modo de uso y dosificación:

Aplice **Impacto Spray** en la área afectada y alrededor de ella, manteniendo el envase en cualquier posición, gracias a su "doble válvula spray", a una distancia de 20 cm de la zona que se está tratando.

Spray corresponde al mecanismo de administración.

Precauciones y contraindicaciones especiales del producto:

No utilizar medicamentos con el plazo de validez vencido.

Nunca lo administre por vía oral.

No lo use en gatos y perros.

Tiempo de Retiro:

No hay período de retiro.

Reacciones adversas:

El producto no provoca reacciones adversas si utilizado conforme las recomendaciones del fabricante.

EL FABRICANTE GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO CORRESPONDEN A LAS ANOTADAS EN LA ETIQUETA Y QUE MEDIANTE REGISTRO OFICIAL DE VENTA SE VERIFICÓ QUE ES APTO PARA LOS FINES AQUÍ RECOMENDADOS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE EMPLEO.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Leer la etiqueta antes de usar el producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones y advertencias de su uso y aplicación:

Evite la ingestión o la inhalación del producto.
No fume mientras se aplica el producto.

Lávese muy bien las manos después de manipular el producto.

No reutilice, perforo o tire al fuego los envases vacíos.

Devolver envases vacíos a la cadena de recolección post-consumo.

Instrucciones de primeros auxilios:

Organofosforado: Inhibidor del Acetilcolinesterasa.

Antídoto y tratamiento médico:

Antídoto: Atropina solución al 1%.

En caso de intoxicación del animal, llamar al médico veterinario.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente.

Medidas para protección del medio ambiente:

No contaminar ríos, lagos y el ambiente.

Producto tóxico para peces, abejas y pájaros.

No permita animales en la zona tratada.

Almacenamiento y manejo del producto:

No utilizar el producto con plazo de validez expirado.

Conservar en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

Condiciones de manejo y disposición de desechos de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.

Después de usar el contenido evitar perforación y llevar el envase a centros de recolección posconsumo.

Propietario y fabricante/
Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

Responsable Técnica:
Dra. Caroline Della
Nina Pistoni CRMV/SP 24.508.
Médica veterinaria.

Fabricante/Elaborado por:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 113,
Caixa 611 -Bairro Barreiro,
Araçoiaba da Serra-SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

Importado y distribuido por:
Ouro Fino Colombia S.A.S. -
Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222
Bloque B - Medellín, Colombia
Tel.: (57) 4 366-1429

 **ourofino**
salud animal