

Iver LA

Uso Veterinario

Solución Inyectable
Larga Acción

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina 1,00 g

Excipientes c.s.p. 100,00 mL

Solución inyectable estéril.

Para el tratamiento y control de
parásitos internos y externos de
los bovinos.

Endectocida de Amplia Acción

Indicaciones:

Iver LA es un endectocida
avanzado, de amplio espectro,
de acción prolongada, indicado
para el control de los nematodos
gastrointestinales y pulmonares,
sarna, garrapatas y nuca de los
bovinos.

Nematodos gastrointestinales:

Ostertagia ostertagi,
Haemonchus placei,
Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus colubriformis,
Cooperia spp, *Cooperia*
oncophora, *Cooperia punctata*,
Strongyloides papillosus,
Nematodirus spp,
Oesophagostomum radiatum,
Oesophagostomum venulosum,
Trichuris spp.

Nematodo pulmonar:

Dictyocaulus viviparus

Parásitos Externos:

Nuque:

Larvas de *Dermatobia hominis*,
Hypoderma bovis y *H. lineatum*.

Ácaros:

Ayuda en el control de *Chorioptes*
bovis

Sarcoptes scabiei - var. *bovis*

Piojos:

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Solenopotes capillatus

Garrapatas:

Ayuda en el control de
Rhipicephalus microplus.

Iver LA ayuda en el control de las
miasis cutáneas (gusaneras)
causadas por la etapa larval de
la mosca *Cochliomyia*
hominivorax.

Modo de uso y dosificación:

Aplicar por vía subcutánea, en la
dosificación de 1 mL por cada 50
kg de peso vivo, de acuerdo con
la siguiente tabla:

Peso (kg)	Dosis (mL)
50 kg	1,0 mL
100 kg	2,0 mL
200 kg	4,0 mL
300 kg	6,0 mL
400 kg	8,0 mL
500 kg	10,0 mL

Dosificación equivalente a 200 µg de Ivermectina por kg de masa corporal.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar el producto por vía intravenosa o intramuscular. No posee efectos colaterales ni secundarios indeseados cuando se respeten las dosificaciones indicadas. En caso de ocurrir intoxicación, hacer tratamiento sintomático (no hay antídoto).

Precauciones y advertencias:

Respetar las dosificaciones recomendadas para el uso del producto. No tirar los envases vacíos en ríos ni lagos. Producto tóxico para peces y algunos organismos acuáticos.

Tiempo de Retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar a vacas en producción de leche, ni en los 42 días antes del parto.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa, en temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS, ANIMALES**

**DOMÉSTICOS Y PERSONAS
DISCAPACITADAS.**

**CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA
MÉDICA.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Registros:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.º 933/05

Colombia: Reg. ICA 6355 – MV

Ecuador: Reg.

3A1-B1-3-8675-AGROCALIDAD

Guatemala: Reg.

BR211-104-02-1128

Honduras: Reg. PF 3515

Nicaragua: Reg. 6860

Panamá: N.º RF-3335-15

Paraguay: Reg. SENACSA N.º 8.156

Venezuela: Reg.

INSAI2041PI33N07758 Asesora

técnica: Dra. Judith Santos de
Rojas.

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330, km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

Tel/Fax: 55 16 3518 2025

www.ourofino.saudeanimal.com

Hecho en Brasil

 **ourofino**
salud animal