Iver LA

Uso Veterinario

Solución Inyectable
Larga Acción

Composición:

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina ..... 1,00 g
Excipientes c.s.p. ..... 100,00 mL

Solución inyectable estéril.

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los bovinos.
Endectocida de Amplia Acción

Indicaciones:

Iver LA es un endectocida avanzado, de amplio espectro, de acción prolongada, indicado para el control de los nematodos gastrointestinales y pulmonares, sarna, garrapatas y nuche de los bovinos.

Nematodos gastrointestinales:
Ostertagia ostertagi, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia spp, *Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Strongyloides papillosus, Nematodirus* spp, *Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum venulosum, Trichuris* spp.

Nematodo pulmonar:
Dictyocaulus viviparus

Parásitos Externos:
Nuche:
Larvas de *Dermatobia hominis, Hypoderma bovis* y *H. lineatum*.
Ácaros:
Ayuda en el control de *Chorioptes bovis*
Sarcoptes scabiei - var. *bovis*
Piojos:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus
Garrapatas:
Ayuda en el control de *Rhipicephalus microplus*.

Iver LA ayuda en el control de las miasis cutáneas (gusaneras) causadas por la etapa larval de la mosca *Cochliomyia hominivorax*.

Modo de uso y dosificación:

Aplicar por vía subcutánea, en la dosificación de 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Peso (kg)	Dosis (mL)
50 kg	1,0 mL
100 kg	2,0 mL
200 kg	4,0 mL
300 kg	6,0 mL
400 kg	8,0 mL
500 kg	10,0 mL

Dosificación equivalente a 200 μg de Ivermectina por kg de masa corporal.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar el producto por vía intravenosa o intramuscular. No posee efectos colaterales ni secundarios indeseados cuando se respeten las dosificaciones indicadas. En caso de ocurrir intoxicación, hacer tratamiento sintomático (no hay antídoto).

Precauciones y advertencias:

Respetar las dosificaciones recomendadas para el uso del producto.
No tirar los envases vacíos en ríos ni lagos.
Producto tóxico para peces y algunos organismos acuáticos.

Tiempo de Retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.
No administrar a vacas en producción de leche, ni en los 42 días antes del parto.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa, en temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Responsable Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Registros:
Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.° 933/05
Colombia: Reg. ICA 6355 - MV
Ecuador: Reg. 3A1-B1-3-8675-AGROCALIDAD
Guatemala: Reg. BR211-104-02-1128
Honduras: Reg. MV-1-3515
Nicaragua: Reg. 6860
Panamá: Reg. N° RF-3335-15
Paraguay: Reg. SENACSA N° 8.156
Venezuela: Reg. INSAI2041PI33N07758 Asesora técnica: Dra. Judith Santos de Rojas.

Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

5000552I /0722 OF00

ourofino
salud animal