

Zitrocox-2 (200 mg)

Uso Veterinario

Antibioticoterapia asociada con el tratamiento de la inflamación.

Fórmula:

Cada comprimido de 400 mg contiene:
Azitromicina (Dihidrato)* 200,00 mg
Meloxicam 2,00 mg
Excipientes q.s.p. 400,00 mg
*Equivalente a aproximadamente 209,62 mg de Azitromicina Dihidrato.

Generalidades:

Zitrocox-2 (200 mg) es un producto que asocia un antibiótico bactericida del grupo de los macrólidos - la Azitromicina - y un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) - el Meloxicam.

La Azitromicina es un antibiótico moderno que presenta, características farmacocinéticas que permiten altas concentraciones intracelulares y prolongada permanencia en los tejidos, proporcionando así, resultados terapéuticos con un período más corto de tratamiento.

El Meloxicam bloquea selectivamente la COX - 2, proporcionando actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de estos efectos, el Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos degenerativos óseos y cartilaginosos.

Indicaciones:

Zitrocox-2 (200 mg) proporciona antibioticoterapia, combatiendo la causa de las infecciones, mientras trata la inflamación y sus efectos.

Zitrocox-2 (200 mg) es indicado en el tratamiento de afecciones respiratorias (causadas por *Bordetella* spp, *Chlamydia* spp, *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp, *Shigella* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*), piel y anexos (causadas por *Corynebacterium* spp, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp y *Pausterella multocida*), urogenitales (*Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*), digestivas (diarreas causadas por *Escherichia coli*), orales (gengivitis y periodontitis) y artritis séptica, osteomielitis y discospondilitis (*Escherichia coli*). En el postoperatorio de artroplastias, cirugías óseas, cirugías ortodoncias y en el tratamiento de la enfermedad periodontal.

En perros para el tratamiento de infecciones causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus* sp, *Pasteurella* sp, *Clamydia* sp y *Corynebacterium* sp. Para controlar el dolor y la inflamación asociada.

Modo de uso y dosificaciones:

Administrar el comprimido siguiendo la dosis como indicado en la tabla abajo:

	Dosificación para perros
Zitrocox-2 (200 mg)	1° día de tratamiento 2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal*
	2° día de tratamiento en adelante 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal**

*Dosis equivalente a 20 mg/kg de peso corporal de Azitromicina y 0,2 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

**Dosis equivalente a 10 mg/kg de peso corporal de Azitromicina y 0,1 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

Intervalo entre dosis:

Zitrocox-2 (200 mg) debe ser administrado una vez al día.

Duración del tratamiento:

Para la mayoría de las afecciones se recomienda de tres a cinco días consecutivos de tratamiento, pudiendo este periodo ser ajustado de acuerdo con el cuadro clínico y orientación del médico veterinario.

Las piodermitis profundas pueden necesitar de un período mayor de terapia. Independiente del cuadro clínico, el tratamiento deberá ser realizado hasta 48 horas después del desaparecimiento de la sintomatología clínica.

Precauciones:

Obedecer las dosificaciones y vías de administración indicadas para el uso del producto. Solamente el médico veterinario está apto a realizar las debidas alteraciones en las dosificaciones recomendadas para el uso del producto. El tratamiento de animales viejos o con menos de 06 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, siendo necesario reducir, en algunos casos, la dosificación que será administrada.

Descontinuar el tratamiento ante la ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida del apetito.

Interacciones Medicamentosas y Contraindicaciones de Uso:

No administre juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides, o después de un tratamiento con estas drogas.

No administre juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos.

La Azitromicina puede aumentar los niveles de carbamazepina, ciclosporina y digoxina por interferir en el metabolismo de estas sustancias.

No administre junto con agentes anticoagulantes como la warfarina o aspirina.

No administre con antiácidos.

No administre en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desorden hemorrágica o hipersensibilidad al producto.

No administre en perras preñadas en el tercio final de la gestación o en lactación.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como pérdida de apetito, vómito, diarrea,

melena y apatía. Generalmente estas reacciones son transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o término del tratamiento.

Pueden ocurrir casos raros de choque anafiláctico.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica del médico veterinario.

Las informaciones contenidas en este inserto son soportadas por estudios realizados con el producto y descripciones de literaturas referenciadas a continuación: ADAMS, 2003; AHRENS, 1997; AIELLO, 1998; ALLEN et al., 2005; ANDRADE et al., 2001; BATTISTINI et al., 1994; BUSCH et al., 1998; CASTRO et al., 1999; DOIG et al., 2000; EMEA, 1999; FRASER et al., 1996; GIRARD et al., 1987; GUERRA et al., 2001; HUNTER et al., 1995; JOHNSTON & FOX, 1997; JONES et al., 2002; MATHEWS et al., 2001; MOREAU et al., 2003; MUGFORD et al., 2000; PLUMB, 2002; RANG et al., 2003; SENGUPTA, 1999; SHEPARD & FALKNER, 1990; SILVA & SCHOSLER, 2005; SIMIONATO et al., 2003; SPINOSA et al., 2002; VIANA, 2003.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

Colombia: Reg.: ICA 9901-MV – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195
Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia
- Tel.: (57) 4 366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhangüera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil