



Uso Veterinario

Endectocida de amplio espectro para bovinos, a base de Ivermectina y Sulfóxido de Albendazol

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina	0,80 g
Sulfóxido de Albendazol	10,0 g
Vehículo c.s.p.	100,00 mL

Generalidades:

La Ivermectina es un derivado semisintético de las avermectinas, que son un grupo de lactonas macrocíclicas químicamente relacionadas y que son producidas por la fermentación del hongo *Streptomyces avermitilis*. Esta molécula es altamente activa contra un gran número de especies de nematodos pulmonares y gastrointestinales, así como sarnas, garrapatas, moscas y larvas de dípteros. El Sulfóxido de Albendazol, un medicamento de la clase de los benzimidazoles, es indicado para tratamiento de enfermedades causadas por parásitos gastrointestinales, tanto en sus formas larvales, como adultas. Actúa en nematodos, cestodos y algunos protozoarios, siendo también eficaz en parasitosis hepáticas y pulmonares.

Indicaciones principales:

El producto **evol** es un endectocida de

amplio espectro para bovinos, indicado para el tratamiento y control de los nematodos gastrointestinales *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* y *Trichostrongylus axei*; tratamiento y control de infestaciones por larvas de *Dermatobia hominis* y por la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Modo de Uso y Dosificaciones:

Agitar el producto antes de usar.

Aplicar por la vía subcutánea, en la dosificación de 01 (un) mL para cada 40 kg de peso corporal, de conformidad con el cuadro a continuación:

Peso	Dosificación de evol
40 kg	1 mL
100 kg	2,5 mL
200 kg	5 mL
300 kg	7,5 mL
400 kg	10 mL
500 kg	12,5 mL
1 mL a cada 40 kg	

Dosificación equivalente a 0,2 mg de Ivermectina y 2,5 mg de Sulfóxido de Albendazol por kilogramo de peso vivo.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar el producto por las vías intravenosa o intramuscular.
No aplicar en hembras preñadas.
Estudios clínicos realizados con el **evol** en bovinos con edad superior a 02 meses mostraron que el producto es seguro, cuando utilizado de conformidad con las recomendaciones del fabricante.

Precauciones:

Respetar las dosis recomendadas para el uso del producto. No utilizar el producto con plazo de validez vencido. Las modificaciones en la dosis, régimen terapéutico y modo de uso quedan a criterio del médico veterinario.
Restos de productos y de envases deben ser descartados de conformidad con lo que establece la legislación en vigor.
Tras abierto, el producto deberá ser utilizado en hasta 04 meses.

Reacciones Adversas:

No son esperadas reacciones adversas con el uso de **evol** dentro de la posología recomendada, sin embargo, reacciones de sensibilidad individuales pueden eventualmente ocurrir. Para estos casos, se indica el tratamiento sintomático.
Puede ocurrir edema transitorio y la formación de pequeño nódulo en el sitio de la administración, generalmente sin la necesidad de tratamiento.

Tiempo de Retiro:

Bovinos:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano

hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.
No administrar en bovinos en producción de leche para el consumo humano.

Conservar en local seco y fresco, en temperaturas entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar intensa.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN BAJO ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Importado y Distribuido por:

Colombia: Reg. ICA 10003-MV – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia – Tel.: (57) 4 366-1429

México: Reg. Q-7750-088 – Ouro Fino de México S.A de C.V – Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe – Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 – Tel.: (52) 01 33 3620-3812

Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

