

# Safesui Circovirus

Uso Veterinario

Vacuna contra Circovirus Porcina

Suspensión acuosa

Producto Derivado de un Organismo Genéticamente Modificado

## Composición:

Vacuna derivada de un Organismo Genéticamente Modificado que contiene la proteína de cápside del Circovirus Porcino tipo 2b (PCV2b).  
Cada 1 mL contiene la cantidad mínima de 7 µg de proteína de cápside del Circovirus Porcino tipo 2b (PCV2b). Excipientes c.s.p. .... 1 mL.

## Indicación:

Indicado para la inmunización de lechones sanos a partir de 3 semanas de edad como medida auxiliar en la prevención de la Circovirus Porcina y de las Enfermedades Asociadas al Circovirus Porcino (PCVAD).

## Modo de usar y Dosis:

### Agitar el frasco antes de usar.

Antes de la aplicación de la vacuna, la región debe estar limpia y desinfectada.

La vacunación debe ser realizada en lechones con edad igual o superior a 21 días.

La administración de la vacuna puede ser realizada por medio de dos protocolos de vacunación:

- **Dosis única:** Administrar una única dosis de 2 mL por la vía intramuscular.

- **Dos dosis consecutivas:** Administrar dos dosis de 1 mL cada una por la vía intramuscular, con intervalo de 14 días entre las aplicaciones. Se sugiere que la segunda dosis sea administrada en la región contralateral a la primera dosis.

## Reacciones posvacunales:

Excepcionalmente, como cualquier producto biológico, la vacuna podrá causar una reacción de hipersensibilidad.

## Precauciones:

Vacunar solamente animales sanos.  
Seguir correctamente las instrucciones de uso.  
Utilizar jeringas y agujas desechables.  
No utilizar el producto con plazo de validez expirado.  
Evitar el contacto con la piel y ojos del aplicador.  
No utilizar otras vacunas o medicamentos simultáneamente en el mismo aplicador.  
Todo medicamento no utilizado o los derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normatividad local aplicable.

**Tiempo de retiro:** Cero (0) días.

Conservar a temperatura entre 2°C a 8°C. No congelar.

Los envases vacíos y restos de producto deben ser desechados conforme a la normatividad local vigente.

No desechar en ríos ni lagos.

Después de abierto el frasco, la vacuna deberá ser completamente utilizada.

**Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Responsable Técnica:** Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

**Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del Médico Veterinario.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

## Importado y distribuido por:

**Colombia:** Reg. ICA No. 11003-BV. Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429

**Ecuador:** Reg.: RIP-BIO-70 - ISOVET S.A. - General Anda Aguirre Oe5-208 y Machala, Quito, Ecuador.

**México:** Reg.: B-7750-001 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México - Tel.: (52) 01 33 3620-3812

**Paraguay:** Reg.: SENACSA N° 28.246- Agroveterinaria Provet de Manuel Carvallo Hab. N: 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429

**Responsable Técnica:** Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

## Elaborado por:

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhangüera SP 330 km 278  
CEP 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Hecho en Brasil

50006951/0825 OFPO

 **ourofino**  
salud animal