

Safesui Mycoplasma

Uso Veterinario

Vacuna contra *Mycoplasma hyopneumoniae*

Composición:

Cada 1 mL contiene $\geq 0,05$ g de suspensión bacteriana inactivada de *Mycoplasma hyopneumoniae*, adyuvantes y conservante. Excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones:

Safesui Mycoplasma está recomendada para aplicación en porcinos saludables, como auxiliar en la prevención de la neumonía enzoótica causada por *M. hyopneumoniae*.

Modo de uso y dosis:

Agitar el frasco antes de su utilización.

Antes de la aplicación de la vacuna la región debe estar limpia y desinfectada.

La administración de la vacuna debe ser realizada en lechones con edad igual o superior a 21 días.

Administrar en la dosis de 2 mL ($\geq 0,10$ g de suspensión bacteriana inactivada de *Mycoplasma hyopneumoniae*), por animal, por la vía intramuscular, en la región del cuello, en única administración.

La vacunación de hembras preñadas, con edad gestacional entre 80 y 90 días, debe ser realizada por medio de la administración de la vacuna en la dosis de 2 mL por animal, por la vía intramuscular en la región del cuello, en única administración.

Otro esquema de vacunación podrá ser adoptado, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas y a criterio del médico veterinario.

Reacciones pos vacunación:

Excepcionalmente, como cualquier producto biológico, la vacuna podrá causar una reacción de hipersensibilidad, en estos casos se indica tratamiento sintomático.

Puede ocurrir edema en el sitio de aplicación, generalmente con resolución espontánea.

Después de abierto el frasco, la vacuna deberá ser utilizada completamente. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

Venda bajo prescripción y aplicación bajo orientación del médico veterinario.

Precauciones:

Vacune solamente animales sanos.

Siga correctamente las instrucciones de uso. No utilizar el producto con plazo de validez vencido.

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Evite el contacto con la piel y los ojos y preste atención para evitar la auto inyección de la vacuna e injuria por la aguja mientras esté administrando el producto.

En la eventualidad de auto inyección accidental, procure asistencia médica inmediatamente.

El uso del producto no requiere período de retiro.

Conservar a temperatura entre 2°C y 8°C. No congelar.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni – CRMV/SP 24.508

Importado y Distribuido por: Colombia: Reg.:

ICA 10731-BV – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 A 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia – Tel.: (57) 4 366- 1429 /

Ecuador: Reg.: RIP-02-BIO-00012 – PRODUCTOS NUTRICIÓN Y SERVICIOS PRONUTROS CIA. LTDA – Gaspar de Escalona N39-29 y Granda Centeno, Quito, Ecuador

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

