

# Supravac LCH

¡Una vacuna específica para problemas reproductivos!



- Segura: contiene virus inactivados en su formulación;
- Presentación en forma de solución, facilitando el manejo del productor;
- Presenta en su formulación una masa antigénica altamente purificada, para una mayor respuesta de los anticuerpos;
- Eficaz: herramienta estratégica para aumentar las tasas de concepción en IATF y reducir las pérdidas de preñeces.



#### Fórmula:

Producto compuesto de suspensión líquida conteniendo virus inactivado por betapropiolactona de IBR-Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, BVD-Diarrea Viral Bovina Tipos 1 y 2, obtenidos en cultivo celular y bacterinas de *Leptospira pomona*, *L. hardjo*, *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. grippotyphosa*, *L. wolffii*, *Campylobacter foetus venerealis* var. *venerealis* y var. *intermedius* y de *Haemophilus somnus* muertos por formol y calor, en gel de hidróxido de aluminio.

#### Indicaciones:

Indicada en la profilaxis de las enfermedades reproductivas bovinas.

#### Modo de uso y dosificaciones:

Aplicar 5 mL por animal por la vía subcutánea.

Animales primovacunados: aplicar una dosis y repetir

después de 30 días. Revacunar semestralmente con una dosis.

Terneros: aplicar la primera dosis a los 6 meses, repetir la dosis después de 30 días. Revacunar semestralmente con una dosis.

Animales en edad reproductiva: Machos y hembras ya vacunados anteriormente deben de recibir una dosis 30 a 60 días antes de la época de monta. Machos y hembras no vacunados deben de recibir una dosis 60 días antes de la época de monta y un refuerzo 30 días antes de la época de monta.

#### Conservación:

Conservar el producto bajo refrigeración (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

#### Presentación:

Frasco por 50 ml (10 dosis).