

# Meloxifin Solución Oral

Uso Veterinario

Antinflamatorio  
Solución oral

## Composición:

Cada 100 mL contiene:

Meloxicam ..... 0,1 g  
Excipiente c.s.p. .... 100,0 mL

## Indicaciones:

**Meloxifin Solución Oral** está indicado para el tratamiento de la inflamación en perros y gatos.

## Generalidades:

El Meloxicam es un antiinflamatorio no

esteroideo (AINEs), derivado del ácido enólico y perteneciente al grupo de los Oxicams. Posee excelentes propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas. Es considerado un inhibidor selectivo de COX-2, resultando en un menor riesgo de sangrado y/o de daños gastrointestinales cuando se compara con los antiinflamatorios no selectivos de COX-2.

## Modo de Uso y Dosis:

Administrar el producto únicamente por la vía oral, utilizando las dosis definidas en la tabla adjunta, una vez al día (cada 24 horas) por lo menos durante 4 días consecutivos. La duración del tratamiento se estipula conforme la gravedad del cuadro clínico.

	1 <sup>er</sup> día de tratamiento	2° día de tratamiento y posteriores
Perros	0,2 mg/kg – equivalente a 0,2 mL/kg de <b>Meloxifin Solución Oral</b>	0,1 mg/kg – equivalente a 0,1 mL/kg de <b>Meloxifin Solución Oral</b>
Gatos	0,1 mg/kg – equivalente a 0,1 mL/kg de <b>Meloxifin Solución Oral</b>	0,05 mg/kg – equivalente a 0,05 mL/kg de <b>Meloxifin Solución Oral</b>

La jeringa que acompaña el producto es adecuada para el tratamiento de perros hasta 10 kg. La administración en perros con más de 10 kg debe hacerse en fases o con una jeringa comercial de mayor volumen.

## Precauciones:

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la boca de quién aplica el producto. Lavarse las manos con agua y jabón después de la administración. Cumplir con las dosis recomendadas para el uso del producto. No volver a utilizar los envases. Restos de productos y envases vacíos deben descartarse de acuerdo con la ley vigente, evitando la contaminación del medio ambiente.

## Reacciones Adversas:

No se esperan reacciones adversas por el uso del producto cuando la administración se hace de acuerdo con las indicaciones del prospecto. Sin embargo, eventualmente pueden ocurrir reacciones de sensibilidad individual. En caso de reacción, buscar de inmediato a un médico veterinario. La literatura referencia que el principio activo que compone el producto puede causar vómito, diarrea e inapetencia en

algunos animales.

Los animales sometidos al tratamiento durante los estudios clínicos no presentaron reacciones adversas o efectos secundarios después del uso del medicamento de acuerdo con las recomendaciones del prospecto.

#### **Antídotos:**

No hay antídotos específicos. El tratamiento consiste en la interrupción de la terapia con el medicamento y en el tratamiento de soporte y sintomático.

#### **Interacciones Medicamentosas:**

El uso simultáneo con otros antiinflamatorios no esteroideos y/o esteroideos puede empeorar los efectos secundarios de los AINEs.

El uso simultáneo con ácido acetil salicílico puede incrementar el riesgo de toxicidad gastrointestinal.

El uso simultáneo con anticoagulantes puede incrementar el riesgo de sangrados, así como el uso en forma conjunta con medicamentos con potencial nefrotóxico puede incrementar el surgimiento de nefrotoxicidad.

El uso de AINEs con metotrexatos puede llevar a toxicidad.

La dioxina puede ampliar los niveles séricos de los AINEs. Algunos AINEs pueden reducir los efectos de inhibidores de ECA en la presión arterial y reducir los efectos de diuréticos como la furosemida.

#### **Advertencia:**

Seguir las orientaciones del prospecto para la utilización del producto.

#### **Contraindicaciones y Limitaciones de Uso:**

No utilizar en animales con úlcera gastrointestinal activa o cuadros gastrointestinales con sangrado. Utilizar con precaución en pacientes con falla hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos. Utilizar con precaución en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

Cumplir con las dosis recomendadas para el uso del producto.

No utilizar el producto con fecha de caducidad vencida.

No utilizar en animales que presentan hipersensibilidad conocida al Meloxicam.

No utilizar en cachorros y gatitos con menos de 02 (dos) meses de edad.

No se realizaron estudios de seguridad en perras y gatas en gestación o en período de lactancia.

Mantener el producto en su envase original, en un lugar seco y fresco, con temperatura entre 15°C y 30°C y protegido de la luz directa del sol. Después de abierto, consumir el producto dentro de los 06 meses siguientes, manteniéndolo en su envase original, en un lugar seco y fresco, con temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**Consulte a su Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.**

#### **Responsable Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508.

#### **Importado y distribuido por:**

**Colombia:** Reg.: 11007-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 A 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (+57) 4 366-1429/

**México:** Reg.: Q-7750-110 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

#### **Elaborado por:**

Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Hecho en Brasil