

FRONPet

Uso Veterinario

Ectoparasiticida para perros y gatos

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Fipronil 12,50 g

Vehículo c.b.p. 100,00 mL

Indicaciones de uso:

FRONPet es un producto de uso tópico indicado para el combate y control de infestaciones causadas por el ectoparásito *Ctenocephalides felis felis* (pulgas) en perros y gatos y *Rhipicephalus sanguineus* (garrapata) en perros.

Modo de uso:


FRONPet debe ser aplicado exclusivamente por la vía tópica, de acuerdo a las recomendaciones abajo:

- Asegurarse de que el volumen de la pipeta a ser aplicada es compatible con el peso corporal del animal a ser tratado antes de la aplicación en el lugar indicado.


1. Observe si no hay producto en la salida de la pipeta, batiendo en la parte superior de la pipeta.

2. Doble la parte superior de la pipeta en el lugar indicado.

1




2



3. Mantenga el animal en posición confortable para facilitar la aplicación. Alejar los pelos del animal con los dedos hasta que


la piel este visible en cada punto dónde el producto será aplicado.

3



4. Aplique todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel entre la región de la nuca y las escapulas del animal, en varios puntos, evitando que el producto escurra en los pelos del animal.

4



El periodo medio de acción del **FRONPet** es de 30 días. Sin embargo, el intervalo de aplicaciones ectoparasiticidas son extremadamente variables, visto que dependen de diferentes factores como cuestiones biológicas ligadas al parásito (ciclo de vida), nivel de desafío parasitario del ambiente dónde ellos se encuentran y condiciones climáticas.

El control completo de las pulgas y garrapatas depende del tratamiento del animal afectado, de otros animales domésticos presentes en el mismo ambiente y del ambiente en que el animal vive. La indicación del intervalo de aplicaciones queda a criterio del médico veterinario, mediante al desafío parasitario enfrentado por el animal a ser tratado.

Recomendase aguardar 3 días tras la aplicación del producto para bañar los animales tratados.

Dosis:

FRONPet posee cinco presentaciones comerciales diferentes, siendo una para gatos y cuatro para perros, cada una de ellas indicada para un rango de peso de los animales a ser tratados de acuerdo a las tablas abajo:

Dosis para Perros		
Presentación	Volumen de dosis	Peso del animal
Para perros de talla pequeña	0,67 mL	hasta 10 kg
Para perros de talla mediana	1,34 mL	de 10,1 a 20 kg
Para perros de talla grande	2,68 mL 4,02 mL	de 20,1 a 40 kg Perros arriba de 40 kg

Dosis para Gatos		
Presentación	Volumen de dosis	Peso del animal
Para gatos	0,32 mL	hasta 8 kilos

Precauciones:

Obedecer al modo de aplicación del producto.
 Producto para aplicación en dosis única. No se recomienda el fraccionamiento de **FRONPet**, debiendo ser utilizada la dosis indicada para cada rango de peso.
 Evite manosear el animal o colocar collares hasta que el lugar de aplicación del producto esté completamente seco.
 Evite contacto con los ojos y contacto innecesario con la piel lavándose las manos antes y después de la aplicación. Cuando exista contacto accidental lavar de forma abundante con agua corriente.
 No guardar o mantener el producto próximo a los alimentos.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No utilizar el producto con plazo de caducidad vencido.
 No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad al componente del producto, se ha visto que pueden ocurrir irritaciones transitorias, tales como hiperemia, ligero prurito en el lugar de aplicación y vómito.
 El producto no debe ser utilizado en perros con menos de 4 semanas de edad y gatos con menos de 12 meses de edad.
 No se recomienda la utilización del producto en hembras preñadas y lactantes por no haber estudios que garanticen la seguridad de la aplicación del producto en estas fases fisiológicas.

Reacciones adversas:

El producto no provoca reacciones adversas si utilizado conforme las recomendaciones del fabricante.
 Reacciones de hipersensibilidad son raras. Sin embargo, irritaciones transitorias en el lugar

de aplicación pueden ocurrir y animales que muestren reacciones de sensibilidad al fipronil no deben ser tratados nuevamente. Los perros pueden presentar una discreta mancha aceitosa y eventual formación de polvo blanco en el lugar de aplicación del producto, dicha alteración desaparece en hasta 48 horas tras la aplicación.

Conservar el producto en su embalaje original, en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.

Importado y distribuido por:

Reg. Q-7750-087
 Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
 Rod. Anhanguera SP 330, km 298
 CEP: 14140 000 Cravinhos SP
 CNPJ: 57.624.462/0001-05
 Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinoaudeanimal.com
 Hecho en Brasil