

Meloxifin comprimidos 0,5 mg

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide para perros y gatos.

Composición:

Cada comprimido de 200 mg contiene:

Meloxicam 0,5 mg

Excipientes c.s.p. 200,0 mg

Indicaciones:

Meloxifin Comprimidos 0,5 mg es indicado como analgésico y antiinflamatorio en perros y gatos en casos agudos de afecciones musculoesqueléticas y tejidos blandos. Esta indicado como analgésico previo y posterior a procedimientos quirúrgicos (osteosíntesis y procedimientos de tejidos blandos).

Generalidades:

Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2). El bloqueo selectivo de la COX-2, proporcionado por el Meloxicam, ofrece un duplo beneficio terapéutico, una vez que

resulta en una excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de estos beneficios, el Meloxicam inhibe aún la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos degenerativos óseos y cartilaginosos.

Meloxicam es indicado como analgésico, antiinflamatorio y antiexudativo para perros y gatos, siendo especialmente indicado en las patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del aparato osteomioarticular, tales como: osteitis, artritis, artritis reumatoides, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosantes, displasias coxofemorales, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, postoperatorio de artroplastias y traumatismos.

Dosis y modo de usar:

Administrar el comprimido una vez al día, en dosificación de acuerdo con la tabla que figura a continuación.

Dosificación para perros

Primer día de tratamiento	2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam/kg de peso corporal)
Segundo día de tratamiento en adelante	1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam/kg de peso corporal)

Dosificación para gatos

1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal).

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad del cuadro. En los casos agudos se recomienda el tratamiento por 5 a 7 días. En los cuadros crónicos pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período máximo de 28 días, o a criterio del médico veterinario.

En gatos, el tratamiento no debe pasar los 04 días consecutivos.

Interacciones medicamentosas:

No administrarlo juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides, o inmediatamente después del

tratamiento prolongado con estas drogas. No administrarlo juntamente con antibiótico del grupo de los aminoglicósidos. No administrarlo juntamente con agentes

anticoagulantes, como la warfarina y la aspirina.

Contraindicaciones y limitaciones:

El producto no debe ser administrado en animales con antecedentes de hipersensibilidad al Meloxicam. No administrarlo en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrarlo en animales con posibles úlceras gastrointestinales o que presenten evidencia de desorden hemorrágica o hipersensibilidad al producto. No administrarlo a perras o gatas preñadas en el tercio final de la gestación o en lactación. No utilizar el producto en intoxicaciones por drogas anticoagulantes (Ejemplo: Cumarina).

Precauciones:

Obedecer las dosificaciones y vías de administración indicadas para el uso del producto. Solamente el médico veterinario está apto a hacer modificaciones en las dosificaciones recomendadas para el uso del producto.

El tratamiento de animales de edad o con menos de 6 semanas de edad debe ser cuidadosamente seguido por el médico veterinario, siendo necesario, en algunos casos, reducir la dosificación que se administrará.

Descontinuar el tratamiento en la ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida del apetito.

No reutilizar los envases. Los restos del producto y del envase deben ser eliminados como recomienda la legislación vigente, evitando la contaminación del medio ambiente. No desechar en ríos ni lagos.

Reacciones adversas:

Los choques anafilácticos en animales debido al uso del Meloxicam son raros, por lo tanto, el médico veterinario debe estar atento a la posibilidad de ocurrencia.

Pueden ocurrir reacciones generales como pérdida del apetito, vómito, diarrea, melena y apatía. Estas reacciones generalmente son transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o término del tratamiento.

Informaciones para uso médico:

Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideos de la familia de los oxicams y no posee antídoto específico. En el caso de intoxicaciones, realizar tratamiento sintomático.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

**Consulte al médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Importado y Distribuido por:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV - Nº 012565/25 - Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL. - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Colombia:** Reg.: ICA 7155 - MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia. / **Costa Rica:** Reg. MV-8057 / **Guatemala:** Reg. MV-2163 / **México:** Reg. Q-7750-031 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México / **Paraguay:** Reg. SENACSA Nº 8.376 - Agroveterinaria Provet de Manuel Carvallo Hab. N: 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil



Mientras cuidamos de la salud animal, reimaginamos el planeta. Accede reimagina.ourofino.com y conoce nuestras iniciativas para garantizar el equilibrio sostenible de la salud animal y el bienestar del mundo.



ourofino
salud animal