

Meloxifin Premium 0,5 mg

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y condroprotector a base de Meloxicam y Sulfato de Condroitina A.

Fórmula:

Cada comprimido de 600 mg contiene:
Meloxicam 0,5 mg
Sulfato de Condroitina A 100,0 mg
Excipientes c.s.p. 600,0 mg

Generalidades:

Meloxifin Premium 0,5 mg es una asociación de un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibitoria selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), el Meloxicam; con un condroprotector con actividad reparadora de tejidos óseos y cartilaginosa, el Sulfato de Condroitina A.

El bloqueo selectivo de la COX-2 proporcionado por el Meloxicam, confiere un doble beneficio terapéutico, porque resulta en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexcitatoria con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, el Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa. El Sulfato de Condroitina A es un importante componente natural del

cartilago articular que estimula la biosíntesis de proteoglicanos y colágeno, restableciendo la integridad fisiológica y funcional del tejido cartilaginosa y del fluido articular y, consecuentemente, la movilidad articular. Una otra función muy importante del Sulfato de Condroitina A es la neutralización de enzimas que son producidas por el cartilago lesionado y que causan la degeneración del tejido cartilaginosa. Contribuye así para el alivio del dolor, reducción del proceso inflamatorio y regeneración del tejido articular.

Indicaciones:

Meloxifin Premium 0,5 mg es indicado como analgésico, antiinflamatorio, antiexcitatorio y condroprotector para perros y gatos, especialmente en las patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del aparato osteomioarticular, tales como: osteítis, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosante, displasias coxofemorales, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, postoperatorio de artroplastias y traumatismos.

Modo de uso y dosificación:

Administrar el comprimido en dosificación de acuerdo con la tabla abajo, una vez al día.

Dosificación para Perros:

Primer día de tratamiento	2,0 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam y 40 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).
Segundo día de tratamiento en adelante	1,0 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam y 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

Dosificación para Gatos:

1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal
(0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal y 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. En afecciones agudas de los perros se recomienda el tratamiento por 05 a 07 días. En las patologías crónicas pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período máximo de 28 días o a criterio del médico veterinario. En gatos, el tratamiento no debe ultrapasar 04 días consecutivos. La presencia del Sulfato de Condroitina A confiere al Meloxicin Premium 0,5 mg la capacidad de reparación de los tejidos cartilagosos y óseos acometidos de degeneraciones. Recomendamos la continuidad del tratamiento con Sulfato de Condroitina a criterio del médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto. No administrar en hembras preñadas o en lactancia. No utilizar el producto en intoxicaciones por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

Precauciones:

Obedecer a la dosificación y vía de administración indicada para el uso del producto. Solamente el médico veterinario puede hacer alteraciones en las dosis del producto. El tratamiento de animales ancianos o con menos de 6 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, y en algunos casos es necesario reducir la dosis a ser administrada. Descontinuar el tratamiento en la ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida de apetito.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetito, vómito,

diarrea, melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides o tras el uso de esas drogas. No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos. No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina o el ácido acetilsalicílico.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y de las mascotas.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta del médico veterinario.

Las informaciones contenidas en este inserto son soportadas por estudios realizados con el producto y descripciones de literaturas referenciadas abajo: CAULEKETT ET AL., 2003; NARITA, 2006; PLUMB, 2002; SPINOSA, 2005; SPINOSA ET AL., 2008; USP, 2004; WALLACE, 2003.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por: Colombia: Reg.: ICA N° 9910 - MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429 / México: Reg. Q-7750-105 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe - Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 - Tel.: (52) 01 33 3620-3812

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 278
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel./Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil