

# Mastifin

Uso Veterinario

## Composición:

Cada jeringa de 10 mL contiene:  
Gentamicina base  
(como Sulfato) ..... 150,0 mg  
Bromhexina clorhidrato ..... 50,0 mg  
Excipientes c.s.p. .... 10,0 mL

## Indicaciones:

**Mastifin** es una combinación de un antibiótico de amplio espectro, la Gentamicina, y un mucolítico, la Bromhexina. El producto es indicado en el tratamiento de mastitis agudas y subclínicas de vacas en lactación, ocasionadas por gérmenes sensibles a la Gentamicina como: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas* spp.

## Dosis y vía de administración:

**Mastifin** debe ser administrado después de la ordeña por vía intramamaria, instilando en el canal o conducto galactóforo, todo el contenido de una jeringa, o sea, 10 mL en cada cuarto afectado, con intervalo de 24 horas, repetir la instilación hasta 3 días consecutivos.

## TIEMPO DE RETIRO:

**LOS ANIMALES TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 30 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.**

**LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 96 HORAS (O**

**4 DÍAS) DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO, NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO.**

## Advertencias:

- No debe ser aplicado en vacas con hipersensibilidad a la Gentamicina.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

## Condiciones de almacenamiento y conservación:

Consérvelo en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre 15°C y 30°C, al abrigo de luz solar.

**Venta bajo fórmula del médico veterinario. Consulte al médico veterinario.**

## Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508.

## Registro:

**Colombia:** Reg. ICA 4957-DB

**Honduras:** Reg. PF 3160

**Panamá:** Reg. RF 1938-11

**Paraguay:** Reg. SENACSA N° 5200

**Perú:** Reg. SENASA - F.95.18.I.0016

## Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Hecho en Brasil

5000345Z/0920-0F00

# Aplicación del Mastifin



1º Agotar el cuarto afectado.



2º Limpiar y desinfectar el cuarto afectado.



3º Introducir la punta de la jeringa en el canal.



4º Instilar todo el contenido de la jeringa.



5º Masajear el cuarto presionándolo desde abajo hacia arriba.